

Франц Герман

Посвящаю Н. М.

К вопросу о непериодическом замощении плоскости

franz.h-n@yandex.ru

«История апериодических мозаик и их связь с математической логикой – одна из интереснейших, но ещё недописанных глав в науке о мозаиках»

(Б. Грюнбаум, Дж. Ч. Шепард) *

Как известно, вопрос о существовании фигуры, при помощи которой можно было бы замостить плоскость только непериодическими мозаиками до сих пор остаётся открытым.

В данной заметке мы хотим предложить вниманию читателя, построенную нами фигуру, при помощи которой, при определённых начальных условиях замощения, непериодические мозаики строятся с намного большей вероятностью нежели периодические.

Насколько нам известно, данную фигуру пока ещё никто не использовал для построения непериодических мозаик на плоскости.

Забегая вперёд можно сказать, что данные замощения носят характер квазикристаллических мозаик. По нашему мнению, именно этот факт, может быть, будет наиболее интересен для многих читателей.

1. Плашка для мозаики

Как известно, кристаллы обладают симметрией 2, 3, 4 и 6-го порядков. Живой природе присуща в основном симметрия 5-го порядка. Именно наличие этой симметрии и является своего рода защитой от кристаллизации живой природы. А т. к. непериодичность мозаики как раз и является нарушением кристаллического порядка мы и отталкивались при поиске фигуры для непериодического замощения плоскости именно от правильного пятиугольника.

Построенная нами фигура по своей сути является геометрической перестройкой правильного пятиугольника. Покажем подробно все этапы построения (перестройки).

Рассмотрим правильный пятиугольник (Рис. 1).

*) [7], стр. 243




Рис. 1

Перестройка 1: параллельный перенос треугольника FBC на вектор \overrightarrow{CE} (Рис. 2)




Рис. 2

Перестройка 2: поворот ромба $EABF$ на угол в 36° против часовой стрелки вокруг точки E (Рис. 3)




Рис. 3

Перестройка 3: зеркальное отражение треугольника CDE относительно стороны CE (Рис. 4)




Рис. 4

Фигуру $GHIJC$ назовём перестройкой правильного пятиугольника и будем обозначать: Π_5 . Как видим, построенный пятиугольник имеет четыре одинаковых стороны и одну, существенно отличающуюся от предыдущих четырёх, по длине.

При использовании такой фигуры, для замощения плоскости и в силу предыдущих построений, очевидно, что большая сторона одной фигуры для построения будущих мозаик должна прилегать к большей стороне другой фигуры. А это существенное ограничение. Поэтому мы решили использовать для построения наших будущих мозаик фигуру, которая получается дополнением к фигуре Π_5 зеркального её отражения, относительно стороны CG (Рис 5)




Рис. 5

Данную фигуру будем обозначать P_8 , т. к. она имеет 8 одинаковых сторон и, в общем-то, является перестройкой правильного восьмиугольника (мы не будем здесь заниматься перестройкой правильного восьмиугольника) и для сокращения обозначений в тексте будем называть её **клеткой мозаики** или просто **клеткой**.

Кстати будет сказать, что клетка является частью правильного 10-тиугольника.




Рис. 6

Если площадь правильного 10-тиугольника обозначить через S_{10} , а площадь фигуры P_8 - через F_8 , то справедливо будет соотношение:

$$S_{10} = \sqrt{5} \cdot F_8 = 2\sqrt{5} \cdot S_5, \quad (1)$$

где S_5 - площадь правильного пятиугольника, при условии, что стороны правильного пятиугольника и правильного 10-тиугольника равны.

В качестве одной из характеристик фигуры Π_8 введём понятие **главного направления**. Главное направление задаётся вектором \overrightarrow{GC} (Рис. 5, Рис. 7).




Рис. 7

Т. к. клетка является частью правильного 10-тиугольника, а также в силу её построения, она может иметь в мозаике 10 различных главных направлений.

Покажем примеры всех возможных **относительных главных направлений** относительно неподвижной исходной фигуры (Рис. 8 – Рис. 12)




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

На Рис. 8 – Рис. 12 положение одной из фигур фиксировано (эта фигура показана серым цветом). Относительное направление будем обозначать символом δ_i . Относительное направление – это угловая мера между главными направлениями двух фигур в мозаике. Т. о. на Рис. 8 показаны два относительных направления $\delta_0 = 0^\circ$ и $\delta_1 = 36^\circ$. На Рис. 9 – Рис. 12 показаны соответственно относительные направления $\delta_2 = 72^\circ$, $\delta_3 = 108^\circ$, $\delta_4 = 144^\circ$, $\delta_5 = 180^\circ$, $\delta_6 = 216^\circ$, $\delta_7 = 252^\circ$, $\delta_8 = 288^\circ$, $\delta_9 = 324^\circ$.

Очевидно, общая формула для относительного направления в наших обозначениях имеет вид:

$$\delta_i = i \cdot \frac{\pi}{5} \quad (2)$$

Введём понятие сопряжённого относительного направления. Для этого понятия введём обозначение δ_j^* . Тогда для относительного направления δ_i сопряжённым относительным направлением будет δ_j^* , где $i + j = 10$.

Очевидно, что множество δ_i и множество δ_j^* образуют циклические группы 10-го порядка. Бинарной операцией для такой группы будет композиция относительных направлений (т. е. композиция вращений): $\delta_i \circ \delta_j = \delta_k$, где $k \equiv (i + j) \pmod{10}$. Аналогично будем иметь и для сопряжённой группы: $\delta_i^* \circ \delta_j^* = \delta_k^*$.

Кроме того, наша клетка, как геометрическая фигура, имеет 20 диагоналей, которые можно разделить на 7 типов относительно их длин. Диагонали будем обозначать через d_i . Самая короткая по длине диагональ d_1 , самая длинная - d_7 .




Рис. 13

Диагонали d_1 - (BD, DF, BH), d_2 - (BG, GD), d_3 - (EG, DH, FH, FB , AG, CE, CA), d_4 - (HC, AD, BE, CF), d_5 - (CG), d_6 - (HE, AF), d_7 - (AE).

Диагонали d_5 и d_7 можно использовать в качестве локальных ортогональных координат клетки.

Длины диагоналей вычисляются по формулам:

$$d_1 = a\sqrt{3-\varphi}, \quad d_2 = a\sqrt{4-\varphi},$$

$$d_3 = a\sqrt{5-\varphi}, \quad d_4 = a\sqrt{6-\varphi},$$

$$d_5 = a\varphi(3-\varphi), \quad d_6 = a\varphi^2, \quad d_7 = a\varphi\sqrt{5-\varphi}.$$

Из этих формул можно получить несколько очевидных зависимостей:

$$d_2^2 - d_1^2 = d_3^2 - d_2^2 = d_4^2 - d_3^2 = a^2, \quad (3)$$

$$d_1 d_6 = a, \quad (4)$$

$$\frac{d_7}{d_3} = \varphi, \quad (5)$$

$$\frac{d_5 d_6}{d_1} = \varphi^3, \quad (6)$$

где a – длина стороны нашей клетки, φ - «золотое сечение».

Точка $O \equiv AB \cap DE$ - является центром описанной окружности правильного 10-тиугольника, частью которого является наша клетка. Точки A, H, G, F, E принадлежат этой окружности.

2. Алгоритмы замощения

Теперь рассмотрим несколько алгоритмов построения непериодических мозаик при помощи построенной фигуры.

Термин «алгоритм», мы используем здесь, конечно же, не в полном смысле этого слова. Известно, что непериодические замощения плоскости относятся как раз к неалгоритмическим задачам (см., например [11]). Под «алгоритмом» мы будем понимать некоторые начальные условия для построения мозаик.

Алгоритм 1: Выбор случайных относительных направлений.

1). Первая клетка случайным образом укладывается на плоскости. Главное направление этой клетки будем называть **главным направлением будущей мозаики**.

2). Используя таблицу случайных чисел выбираем несколько относительных направлений δ_i . Выбор δ_i производится относительно главного направления мозаики. Здесь каждому δ_k соответствует цифра k в таблице случайных чисел.

Гипотеза 1: *Мозаика всегда будет непериодической если она содержит более 3-х различных направлений δ_i .*

3) Использование таблицы случайных чисел прекращается после выбора не менее 4-х различных δ_i .

4) Из выбранных клеток, соответствующих различным δ_i , произвольным образом строится **ядро мозаики**. Ядром мозаики будем называть несколько выбранных случайным образом клеток, примыкающих друг к другу сторонами.

Гипотеза 2: *Произвольно построенная мозаика вокруг взятого ядра мозаики всегда будет непериодической.*

Покажем пример мозаики, построенной по данному алгоритму (Рис.14).




Рис. 14

На Рис. 14 показана мозаика, где разным цветом окрашены клетки, имеющие разные главные направления.

Надо отметить, что построение мозаик случайным способом по Алгоритму 1 может приводить к невозможности построения всей мозаики. Но мы предполагаем что, всегда существует возможность возврата на два-три шага назад, чтобы избежать тупикового развития построения.

На Рис. 15 приведён фрагмент одной из возможных таблиц случайных чисел.

ТАБЛИЦА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ						
76520	13586	34673	54876	80959	09117	
64894	74296	24805	24037	20636	10402	
19645	09303	23209	02560	15953	34764	
09376	70715	38311	31165	88676	74397	
80157	36147	64032	36653	98951	16877	
34072	76850	36697	36170	65813	39885	
45571	82406	35303	42614	86799	07439	
02051	65692	68665	74818	73053	85247	
05325	47048	90553	57548	28468	28709	
03529	64778	35808	34282	60935	20344	
14905	68607	22109	40558	60970	93433	
39808	27732	50725	68248	29405	24201	
06288	98083	13746	70078	18475	40610	
86507	58401	36766	67951	90364	76493	
87517	64969	91826	08928	93785	61368	

Рис. 15

Рассмотрим комбинацию из трёх клеток (Рис. 16).




Рис. 16

Фигуру, показанную на Рис. 16, будем называть «**Стандартным Ядром**» или сокращённо – **SC** (абревиатура от соответствующих английских слов).

Гипотеза 3: *Если ядром мозаики является фигура SC, то построенная вокруг такого ядра мозаика всегда будет непериодической.*

Алгоритм 2: Использование стандартного ядра.

- 1). В качестве ядра мозаики выбираем фигуру **SC**.
- 2). Дальнейшее построение мозаики осуществляется произвольно.

Покажем несколько примеров подобных мозаик.




Рис. 17

На Рис. 17 показана простейшая из непериодических мозаик, использующая для построения «Стандартное Ядро».

Очевидно, что фигура **SC** может быть размещена в подобной мозаике случайным образом неограниченное число раз.




Рис. 18

Приведём примеры других мозаик, ядром мозаики для которых является фигура *SC*.




Рис. 19




Рис. 20

На Рис. 18 – Рис. 20 клетки разных относительных направлений показаны разным цветом.

Надо отметить, что при помощи нашей клетки можно также строить мозаику, обладающую поворотной симметрией пятого порядка. Пример одной из таких мозаик показан на Рис. 21.




Рис. 21

Для тех, кто заинтересуется дальнейшими самостоятельными исследованиями мозаик, построенных при помощи фигуры P_8 , надо сказать, что фигура SC допускает внутреннюю перестройку (Рис. 22). Внутренняя перестройка показана пунктирными линиями. По сути внутренняя перестройка и является залогом непериодичности, т. к. она не зависит от внешней мозаики. Как бы симметрично ни была построена мозаика внутренняя перестройка SC всегда делает её непериодической.




Рис. 22

Две клетки в мозаике будем называть соседними, если они имеют хотя бы одну общую сторону. На Рис. 23 приведён пример мозаики, в которой есть клетки с максимальным и минимальным количеством соседей.




Рис. 23

Гипотеза 4: *Если одной из клеток в ядре мозаики является клетка с числом соседей равным 7-ми, то мозаика, построенная на основе этого ядра всегда будет непериодической.*

Алгоритм 3: Использование групповых свойств относительных направлений.

1. Для ядра мозаики выбираются две произвольно соседствующие клетки с различными относительными направлениями (например δ_0 и δ_1).
2. Третья клетка имеет относительное направление равное композиции двух первых: $\delta_0 \circ \delta_1 = \delta_1$ и произвольно прикрепляется к нашему ядру.
3. Аналогично выбираются четвёртая и пятая клетки, для которых относительные направления будут, соответственно: $\delta_1 \circ \delta_1 = \delta_2$ и $\delta_1 \circ \delta_2 = \delta_3$.

Гипотеза 5: *При таком построении ядра, мозаика всегда будет непериодической.*

Пример такой мозаики показан на Рис. 24




Рис. 24

Можно предложить огромное количество алгоритмов построения ядра мозаики. Например алгоритм, запрещающий иметь в ядре параллельные относительные направления и др. Мы не будем здесь этим заниматься. Ниже приводятся примеры непериодических мозаик, построенных на подобных алгоритмах.



Рис. 25

3. Модели кристаллических решёток и непериодические мозаики

Как известно [14], идеальной симметрии в природе не существует. Даже, казалось бы, идеальные кристаллические решётки в основной своей массе не выдерживают дальнего порядка.

Мы приведём здесь несколько моделей таких решёток, взятых из различной литературы. Как нам представляется, мозаики, построенные при помощи нашей клетки, могут быть неплохими иллюстрациями для подобных решёток.

Как было сказано, кристаллическая решётка не выдерживает симметрию дальнего порядка. Кристаллическая природа таких кристаллов носит блочный характер Рис. 26 ([14], Рис. 33, стр.71).




Рис. 26

Мозаики, представленные на Рис. 27, как нам кажется, неплохо иллюстрируют блочную модель кристаллической решётки. Здесь мы нанесли на нашу мозаику сетку, соединяя центры тяжести соседних клеток отрезками прямых. Напоминаем, что клетки называются соседними, если у них есть хотя бы одна общая сторона.




Рис. 27

Как видим, полная триангуляция присутствует в основном только в ядре мозаики, как и на сетке Рис. 26.

Очевидно, что мозаики, показанные на Рис. 27, могут быть продолжены на всю плоскость.




Рис. 28

На Рис. 28 (фрагмент Фиг 1. [1], стр.133), показана изменённая схема решётки кристалла графита после столкновения с нейтроном. Мы видим несколько объединённых по трое гексагональных колец, что делает всю решётку непериодической.




Рис. 29

Примерно похожую картину мы наблюдаем и в мозаике, показанной на Рис. 29. Здесь для построения непериодической картины использовалась фигура *SC*.




Рис. 30

Для иллюстрации нарушения кристаллического порядка проводился эксперимент ([9], стр. 80). Брался ящик, на дне которого были рассыпаны металлические шарики. После встряхивания исследовалась картина упаковки шариками дна ящика. Почти всегда наблюдалась картина с дефектами, характерными для непериодической мозаики (Рис. 30).




Рис. 31

На Рис. 31 показана непериодическая мозаика, схематично похожая на ту, что показана на Рис. 30. Как видим, здесь опять присутствует ядро мозаики в виде фигуры SC (разным цветом показаны клетки, имеющие разные главные направления).





Рис. 32

На Рис. 32 (слева, [9], стр. 79), показана схема сращивания двух кристаллических структур в одну. На этом же рисунке (справа) показано сращивание двух непериодических мозаик, построенных при помощи нашей клетки замощения. Причём, в зависимости от того как будут располагаться клетки внутри «серых» фигур SC , общая мозаика может быть центрально-симметричной, зеркально-симметричной или вообще не иметь никакой симметрии.

Гипотеза 6: *Каким бы не было ядро непериодической мозаики, построенной при помощи нашей клетки, с расширением на всю плоскость происходит выравнивание по направлениям сторон правильного 5-тиугольника.*




Рис. 33

Для интереса покажем две мозаики разные по сути, но похожие друг на друга, как «родственники», Рис. 34




Рис. 34

На Рис. 34 (слева) показан фрагмент известной мозаики Хееша ([7], стр. 242). Этот орнамент имеет симметрию 6-го порядка, «колесо» спава на Рис. 34 имеет симметрию 5-го порядка. Надо заметить, что орнамент Хееша не имеет возможности расширения. Наше же «колесо» при расширении замощает центрально-симметрично всю плоскость.


И в заключение данной заметки мы выражаем благодарность Людмиле Шишковой за проявленный интерес и терпение при построении всех цветных иллюстраций примеров наших мозаик.

Литература

1. Е. Вигнер, «Этюды о симметрии», М., «МИР», 1971
2. Г. Вейль, «Симметрия», М., «НАУКА», 1968
3. Д. Пидоу, «Геометрия и искусство», М., «МИР», 1979
4. К. Левитин, «Геометрическая рапсодия», М., «Знание», 1976
5. А. Сонин, «Постижение совершенства», М., «Знание», 1987
6. М. Сенешаль, Дж. Флек, «Узоры симметрии», М., «МИР», 1980
7. Д. Кланер, «Математический цветник», М., «МИР», 1979
8. М. Гарднер, «Путешествие во времени», М., «МИР», 1990
9. В. Гильде, «Зеркальный мир», М., «МИР», 1982
10. М. Гарднер, «От мозаик Пенроуза к надёжным шрифтам», М., «МИР», 1993
11. Р. Пенроуз, «Тени разума», М., «МИР», 1994
12. Р. Пенроуз, «Новый ум короля», М., «МИР»,
13. E. Haeckel, „Kunstformen der Natur“, München-New York, „Prestel“, 1998
14. А. Китайгородский, «Порядок и беспорядок в мире атомов», М., «НАУКА», 1977

Приложение

Пример непериодической мозаики Р. Амманна



Пример непериодической мозаики Р. Пенроуза

